

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas
 aplikācijas īpašnieka vietējo pārstāvniecību: sanofi-aventis Latvija SIA, tel: 67332451.
 Jus varat zīnīt par blakusparādībām tieši Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) elektroniski
 interneta vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes "Zīnīt par zāļu blaknēm,
 negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci" un izvēloties "Pacientiem", Tālrunis informācijai:

Arstejošā ārsta tālruna numurs:

Arstejošā ārsta vārds, uzvārds:

Centra nosaukums:

Datums, kad Aubagio® parakstīts pirmo reizi:

Pacienta vārds, uzvārds:

Svarīga informācija pacientam par zāļu riska mazināšanu

PACIENTA KARTĪTE

Šī Pacienta kartīte satur **svarīgu drošuma informāciju**, kas Jums jāzina, saņemot
 ārstēšanu ar Aubagio®. Lūdzu, skatiet sīkāku informāciju zāļu lietošanas instrukcijā.



Vispārīgas vadlīnijas

Lūdzu, uzrādiet šo kartīti jebkuram ārstam vai veselības
 aprūpes speciālistam, kas iesaistīts Jūsu medicīniskajā
 aprūpē (piemēram, neatliekamās medicīniskās palīdzības
 gadījumā).

Vienu
 reizi dienā

AUBAGIO®
 (teriflunomīds) 14 mg
 tabletes

AUBAGIO ir pieejams 14 mg un 7 mg tabletēs



Svarīgas blakusparādības

Šīs zāles var ietekmēt Jūsu aknu darbību un noteiktas šūnas Jūsu asinīs, kas ir svarīgas, lai cīnītos ar infekcijām.

Ja Jums ir kāda no šādām blakusparādībām, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu:

- Jūsu āda vai acu baltumi kļūst dzelteni, tumšs urīns, slikta dūša vai vemšana un sāpes vēderā. Šajā gadījumā Jums var būt problēmas ar aknām;
- augsta temperatūra (drudzis), klepus, trīce, drebuļi, pietūkuši dziedzeri, samazināta vai sāpīga urīna plūsma vai apjukums. Šajā gadījumā Jums var būt infekcija.



Sievietēm ar reproduktīvo potenciālu, ieskaitot meitenes un viņu vecākus/aprūpētājus

- Ja esat grūtniece vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, nesāciet lietot Aubagio. Lai pārliecinātos, ārsts var lūgt Jūs veikt grūtniecības testu.
- Aubagio lietošanas laikā izmantojiet efektīvu kontracepcijas līdzekli. Ārsts Jūs konsultēs par iespējamo risku auglim un par efektīvas kontracepcijas nepieciešamību.
- Ja vēlaties mainīt kontracepcijas metodi vai vēlaties grūtniecību, sazinieties ar savu ārstu.
- Ja esat grūtniece vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, pārtrauciet teriflunomīda lietošanu un **nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.**
- Grūtniecības gadījumā ārsts var Jums ieteikt ārstēšanu ar noteiktām zālēm, lai paātrinātu teriflunomīda izvadīšanu no Jūsu organisma.
- Jums jākonsultējas ar ārstu arī tad, ja plānojat barot bērnu ar krūti vai to jau darāt.
- Vecākiem/aprūpētājiem vai meitenēm: lūdzu, sazinieties ar savu ārstu, kad pacientei pirmo reizi sākas menstruācijas, lai saņemtu konsultāciju par iespējamo risku auglim un kontracepcijas nepieciešamību.